У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ МЕГАОБЛАСТЬ (СФцМО)

НЕОГЕН

- $N_{1-2}kn$ — Кинельская серия. Глины, глинистые пески, пески с галькой, галечники с линзами конгломератов (50–170 м)
- $N_1vr+u\check{s}$ — Ворошиловская и ушкатлинская свиты объединенные. Глины темно-серые углистые, реже белые каолинит-гидрослюдистые с прослоями песков, галечников и бурых углей (30–400 м)

ПАЛЕОГЕН

МЕЛ

ЮРА

ПРЕДУРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ МЕГАЗОНА (СФцМЗ)

ЮЖНО-ПРЕДУРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА (СФцЗ)

ЛЕМЕЗИНСКО-ТЮЛЬГАНСКАЯ ПОДЗОНА

- N_1tl+vr — Тюльганская, куюргазинская и ворошиловская свиты объединенные. Пески с линзами гравийных галечников, глинистые и углистые алевролиты, глины с прослоями бурых углей и лигнитов (10–80 м)
- K_2ng-hr — Ногайтинская, плотиновская, вербовская и харская свиты нерасчлененные. Пески и песчаники глауконитовые, галечники, мергели, мел, опоки, глины (до 50 м)
- J_3il — Илецкая свита. Алевролиты, пески, глины; прослои бурых углей, линзы галечников (до 120 м)
- $J_{1-3}\check{c}\check{s}+j\check{s}$ — Чашканская, илецкая и юшатырская свиты объединенные. Пески, алевролиты, глины, прослои песчаников, линзы бурых углей, в основании — галечники (до 225 м)

СРЕДНЕ-ПРЕДУРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА (СФцЗ)

- $N_{1-2}kn$ — Кинельская серия. Глины, глинистые пески, галечники, прослои бурых углей (60–150 м)

УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ МЕГАЗОНА (СФцМЗ)

ОРСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА (СФцЗ)

- P_3kz — Казацкая свита. Кварцевые пески с линзами каолинитовых глин; в основании — линзы гравийных галечников (5–15 м)
- $P_{1-2}ul-ak$ — Улеттинская, тыкбутакская, ачкатская свиты нерасчлененные. Глины гидрослюдисто-бейделлитовые с прослоями глауконит-кварцевых песков и алевритов со стяжениями сидерита и марказита, линзами опок (10–30 м)
- $K_{1-2}mk+mg$ — Максайская, песчаниковая, песчано-глинистая, терригенная, глауконит-песчаная, глауконит-терригенная, мергельно-глинистая толщи объединенные. Пески, глины, алевриты, гравийные галечники, конгломераты, глауконитовые пески; прослои мергелей, желваки и линзы фосфоритов (40–210 м)
- $J_{1-2}kt-rm$ — Катынадырская, орская и романкульская свиты нерасчлененные. Глины, пески, алевриты, песчаники, галечники, конгломераты (до 260 м)

ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ МЕГАОБЛАСТЬ (СФцМО)

КАМСКО-БЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (СФцО)

ТРИАС

- T_1st+kz — Старицкая и кзылсайская свиты объединенные. Песчаники, пески, вверху — с прослоями алевритов и глин, внизу — конгломераты (210–320 м)
- T_1kp — Копанская свита. Песчаники, гравелиты, конгломераты, редкие линзы алевритов и глин (45–75 м)

ПЕРМЬ

ТАТАРСКИЙ

- P_3mk+kk — Малокинельская и кутулукская свиты объединенные. Красноцветные глины, алевролиты, песчаники; прослои и линзы известняков, мергелей и конгломератов (200–250 м)

БИАРМИЙСКИЙ

- $P_{2-3}am$ — Аманакская свита. Глины, алевролиты; линзы песчаников, прослои известняков и мергелей (85–125 м)
- P_3ss+bk — Сосновская, сокская и большекинельская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты, глины; прослои известняков, мергелей и доломитов (240–365 м)
  - P_3ur — Уржумская свита. Глины, мергели, известняки; прослои алевролитов, песчаников, линзы мелкогалечных кварцевых конгломератов (до 350 м)
  - P_3bl — Белебеевская свита. Аргиллиты, алевролиты, песчаники с линзами гравийных конгломератов, редкие прослои и линзы мергелей и глинистых известняков (120–220 м)

ПРИУРАЛЬСКИЙ

- $P_1\check{s}\check{s}$ — Шешминская свита. Песчаники граувакковые, алевролиты, аргиллиты с прослоями доломитов, известняков и мергелей (125–375 м)
- P_1sl — Соликамская свита. Известняки, доломиты с прослоями песчаников, мергелей, глин, гипсов и ангидритов (15–230 м)
- P_1ir — Иренская свита. Доломиты, известняки брекчированные, мергели, каменная соль, гипсы и ангидриты (20–500 м)
- P_1fi — Филипповская свита. Доломиты оолитовые, пелитоморфные, плитчатые с прослоями известняков, гипсов и ангидритов (80–180 м)
- $P_1ig+\check{s}t$ — Иргинская, камайская и шуртанская свиты объединенные. Известняки органогенно-обломочные, доломиты окремненные с прослоями глинистых известняков, мергелей и аргиллитов (160–360 м)
  - P_1mk+ir — Мальцевская, белогорская толщи, иргинская, камайская, шуртанская, филипповская и иренская свиты объединенные. Известняки органогенно-обломочные, доломиты окремненные с прослоями мергелей и аргиллитов, реже гипсов и ангидритов (500–1500 м). Только на разрезе
- P_1mk+bg — Мальцевская и белогорская толщи объединенные. Известняки фораминиферовые, органогенно-обломочные, афанитовые, брекчиевые; линзы, желваки и стяжения кремнистых алевропелитов (300–450 м)

ПРЕДУРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ МЕГАЗОНА (СФцМЗ)

АКБУЛАКСКО-КРОПАЧЕВСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА (СФцЗ)

- $T_{2-3}bk+sr$ — Букобайская и суракайская свиты объединенные. Глины, алевролиты, песчаники, прослои бурых углей (250–1000 м)
- T_2dn — Донгузская свита. Пестроцветные глины, алевролиты; линзы песчаников, конгломератов, вверху — бурых углей (175–400 м)
- T_1pt — Петропавловская свита. Песчаники с линзами конгломератов, алевролиты, глины (70–400 м)
- T_1bl — Блюментальская серия. Песчаники, конгломераты с линзами алевролитов и глин (90–800 м)
- T_3sr — Суракайская свита. Глины, алевролиты, песчаники, пески, галечники; линзообразные стяжения сидерита, прослои углистых глин и бурых углей (до 300 м)
- T_2dn+bk — Донгузская и букобайская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты с прослоями и линзами гравелитов и глин (200–950 м)
- T_1bl-pt — Блюментальская серия и петропавловская свита нерасчлененные. Песчаники, пески, алевролиты, глины, гравелиты и конгломераты (100–1300 м)
- $P_3vz-k\check{c}$ — Вязовская и кульчумовская свиты нерасчлененные. Песчаники, алевролиты, глины, конгломераты; прослои известняков и мергелей (210–700 м)
- P_3bl+gr — Белебеевская, салмышская и гребенская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты, глины; прослои известняков (400–1275 м)
  - P_2os+gr — Осиновская, белебеевская, салмышская и гребенская свиты объединенные. Алевролиты, глины, песчаники, конгломераты; прослои известняков (530–1500 м)
- $P_{2-3}sm+k\check{c}$ — Салмышская, гребенская, вязовская и кульчумовская свиты объединенные. Известняки, мергели, песчаники, алевролиты, аргиллиты и конгломераты (500–1500 м)
- P_3os+bl — Осиновская и белебеевская свиты объединенные. Известняки, мергели, песчаники, алевролиты, аргиллиты, линзы конгломератов (560–600 м)
- $P_1n\check{z}$ — Нежинская свита. Переслаивание песчаников граувакковых, алевролитов, аргиллитов с прослоями известняков, доломитов и мергелей, линзы конгломератов (500–1000 м)
- P_1fi-ir — Филипповская и иренская свиты нерасчлененные. Песчаники, гипсы, ангидриты с прослоями известняков, доломитов и мергелей, линзами каменной соли (110–750 м)
- P_1ak+bg — Актастинская и байгенджинская свиты объединенные. Переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков, мергелей и конгломератов (150–1260 м)
- $P_1i\check{s}$ — Ишимбайский риф. Известняки органогенно-обломочные с прослоями доломитов (до 900 м)
- $P_1us+\check{s}\check{t}$ — Ускалыкская, курмаинская, сарабильская, малоикская, кондуровская, байгенджинская и шафеевская свиты объединенные. Алевролиты, глины, песчаники, конгломераты; прослои известняков (1700–2500 м)
- P_1kr-kd — Карамуринская, сарабильская, малоикская и кондуровская свиты нерасчлененные. Переслаивание аргиллитов, алевролитов, известняков, мергелей, песчаников, доломитов (до 500 м)
- P_1us-kn — Ускалыкская и курмаинская свиты нерасчлененные. Известняковые брекчии, конгломераты, афанитовые и органогенно-обломочные известняки, доломиты с прослоями мергелей, линзы черных кремней (до 400 м)

ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ МЕГАОБЛАСТЬ (СФцМО)

КАМСКО-БЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (СФцО)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ МЕГАЗОНА (СФМЗ)

БЕЛЬСКО-ЕЛЕЦКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА (СФЗ)

МИХАЙЛОВСКО-ВАЙГАЧСКАЯ ПОДЗОНА

КУВАНДЫКСКИЙ РАЙОН

- C_3-P_1sr — Сюренская свита. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, прослои известняков и мергелей (700–800 м)
- $C_{2-3}kn$ — Истокская и кунгасская толщи объединенные. Известняки и доломиты, участками окремненные; внизу — редкие прослои аргиллитов (500–1000 м). Только на разрезе
- $C_{2-3}zg+zn$ — Золотогорская, абзановская и зианчуринская свиты объединенные. Ритмичное переслаивание алевролитов, аргиллитов и песчаников; прослои известняков, оползневых конглобрекчий (510–1450 м)
- $C_{1-2}\check{c}\check{c}+k\check{c}$ — Бухарчинская, унбетовская и кугарчинская свиты объединенные. Песчаники, известняки, алевролиты, конгломераты, гравелиты; прослои опок, мергелей, аргиллитов, линзы кремней (700–1300 м)
- $C_1al-g\check{z}$ — Аргиллито-известняковая и гежская толщи нерасчлененные. Известняки органогенные, детритовые и зернистые, часто доломитизированные, аргиллиты; прослои и линзы доломитов, алевролитов и мергелей (800–1700 м). Только на разрезе
- D_3-C_1jm+il — Ямашлинская, мазитовская, куруильская и иткуловская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты; прослои мергелей, известняков, линзы кремней (800–1400 м)

СИМСКО-ЗИГАНСКИЙ РАЙОН

- $C_{2-3}tc$ — Терригенно-карбонатная толща. Известняки, доломиты, известняковые конгломераты и брекчии, сланцы глинистые и кремнисто-глинистые, алевролиты, аргиллиты, песчаники (1400–2250 м)
- C_1di — Доломито-известняковая толща. Известняки глинистые, органогенные, реже детритовые, сгустково-комковатые, пелитоморфные, иногда — брекчиевидные доломитизированные; прослои и линзы доломитов, алевролитов, кремнистых алевролитов, реже песчаников (500–820 м)

БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН

- $C_3-P_1\check{c}g$ — Чигишанская свита. Алевролиты, аргиллиты, мергели, песчаники с прослоями известняков, гравелитов, конгломератов (до 700 м)
- C_3vs — Веселгинская толща. Песчаники кварцевые и граувакковые, аргиллиты, линзы конгломератов, редкие прослои известняков (600–700 м)
- C_2ab — Абдреязковская свита. Песчаники, глинистые сланцы, известняки слоистые, в основании — конгломераты (500–600 м)

ИРГИЗЛИНСКО-КАРСКАЯ ПОДЗОНА

- C_2ur — Ураимская свита. Переслаивание песчаников, аргиллитов и известняков, в основании — известковистые брекчии, мелкогалечные конгломераты (550–600 м)
- C_2ct — Карбонатно-терригенная толща. Известняки органогенные и органогенно-обломочные с тонкими прослоями аргиллитов и алевролитов (200–350 м)
- C_1i — Известняковая толща. Известняки черные тонкослоистые битуминозные, часто глинистые, иногда органогенные; известняковые и кварцевые песчаники, известняковые или кремнисто-известняковые конглобрекчии (470–500 м)

ЗИЛАИРО-ЛЕМВИНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА (СФЗ)

ВЕРХНЕЮРЮЗАНСКО-БАРАКАЛЬСКАЯ ПОДЗОНА

ЮЖНО-УРАЛТАУСКИЙ РАЙОН

- $\gamma\check{c}C_1-k$ — Кананикольский комплекс габбро-гранитовый гипабиссальный. Дайки габбро, долеритов; гранитов

БЕРДЯШСКО-СЫРОСТАНСКАЯ ПОДЗОНА

- $\gamma\check{c}C_{1-2}fs$ — Тургоякско-сыростанский комплекс гранодиорит-гранитовый. Гранодиориты, граниты, реже кварцевые диориты, диориты, лейкограниты

БАРДЫМСКАЯ ПОДЗОНА

- O_1kz — Козинская свита. Конгломераты, гравелиты, песчаники, кварциты, сланцы филлитовидные серицит-кварцевые, реже хлорит-серицит-кварцевые и хлорит-кварцевые (до 400 м)

ОРДОВИК

СРЕДНИЙ

- O_3kt_2 — Курашская свита. Верхняя подсвита. Ритмичное переслаивание кварцитов или кварцевых песчаников с хлорит-кварцевыми, мусковит-кварцевыми или альбит-хлорит-кварцевыми сланцами (до 500 м)
- O_2kt_1 — Курашская свита. Нижняя подсвита. Кварцевые песчаники, кварциты, алевролиты, прослои хлорит-кварцевых сланцев (до 400 м). Нерасчлененная ($O_{2-3}kt$). Кварцевые песчаники, алевролиты, сланцы (до 900 м)
- $S_{1-2}tg$ — Тупоргасская свита. Сланцы слюдисто-графит-кварцевые, углисто-глинисто-кварцевые с подчиненными графитистыми кварцитами (до 500 м)
- S_1mh — Михалкинская толща. Сланцы кремнисто-глинистые, углисто-глинистые; прослои алевролитов, кварцевых песчаников (300–400 м)
- $O_{1-3}sh$ — Сухолядская толща. Песчаники кварцевые, олигомиктовые, алевролиты кварцевые и кремнистые, сланцы глинистые и углисто-глинистые (700–950 м)
- $O_{2-3}kr$ — Кураганская свита. Алевролиты кремнистые, кварцевые, сланцы кремнисто-глинистые, углисто-глинистые, кремнистые, глинистые, филлиты, кварцевые песчаники и алевропесчаники, редкие прослои метасилицитов и апобазальтовых зеленых сланцев (до 1400 м)
- $\gamma\check{c}O_{2-3}kg$ — Козлиногорский комплекс граносиенит-щелочногранитовый. Граносиениты, нефелиновые сиениты, щелочные граниты

РАННИЙ

- O_1ar — Арвякская свита. Кварцевые конгломераты валунные и галечные, гравелиты; прослои кварцевых песчаников (до 600 м)

КАМСКО-БЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (СФцО)

БАШКИРСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА (СФЗ)

ЗАПАДНО-БАШКИРСКАЯ ПОДЗОНА

ВОСТОЧНО-БАШКИРСКАЯ ПОДЗОНА

ВЕНД

КЕМБРИЙ

- V_2bb+kr — Байкибашевская, старопетровская, саликовская, карлинская свиты объединенные. Переслаивание песчаников неравнозернистых полимиктовых, полевошпат-кварцевых, аркозовых и субаркозовых, алевролитов и аргиллитов с прослоями и линзами гравелитов в основании (110–1500 м). Только на разрезе
- V_2kk+zg — Куккараукская и зиганская свиты объединенные. Песчаники кварцевые и граувакковые, прослои алевролитов, углистых аргиллитов, мелко- и среднегалечных конгломератов, гравелитов, редкие линзы известняков (750–1000 м)
- $V_{1-2}bk+bs$ — Бакеевская, урюкская и басинская свиты объединенные. Песчаники кварцевые, аркозовые, олигомиктовые и полимиктовые, алевролиты, аргиллиты и глинистые сланцы, линзы и прослои конгломератов, гравелитов (1100–1700 м)
- $\check{v}\beta V_1km$ — Криволукско-мисаелгинский комплекс габбро-пикродолеритовый гипабиссальный. Дайки, силлы габбродолеритов, габбро, долеритов, умеренношелочных долеритов, пикрит-пикродолеритов, умеренношелочных и щелочных пикритов
- V_2ur+bs — Урюкская и басинская свиты объединенные. Разнозернистые кварцевые, олигомиктовые, полимиктовые, реже аркозовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы, линзы и прослои конгломератов и гравелитов (более 300 м)
- V_1kr+kg — Криволукская и кургашлинская свиты объединенные. Кварцевые, олигомиктовые, реже граувакковые песчаники, кварцевые алевролиты, аргиллиты, тиллитоподобные редкогалечные конгломераты (350–450 м)

ПРОТЕРОЗОЙ

ВЕНД

ПОЗДНИЙ

- $\check{\gamma}RF_3ma$ — Миселинско-авашлинский комплекс сиенитовый гипабиссальный. Дайки сиенитов
- $\check{v}\beta RF_3in$ — Инзерский комплекс габбро-долеритовый гипабиссальный. Дайки габбродолеритов, порфировых и микропегматитовых долеритов, габбро-порфиритов
- RF_3uk — Укская свита. Чередование известняков, иногда мраморизованных, доломитов, кварцевых песчаников с глауконитом, алевролитов, аргиллитов, сланцев серицит-кварцевых, серицит-хлорит-кварцевых; внизу — прослои и линзы конгломератов (280–600 м)
- RF_3mn — Миньярская свита. Доломиты пелитоморфные, реже доломитизированные известняки с тонкими прослоями и линзами кремнистых алевролитов и кварцевых песчаников с глауконитом (500–850 м)
- RF_3in — Инзерская свита. Ритмичное чередование кварцевых песчаников с глауконитом, алевролитов и аргиллитов; в кровле — прослои и линзы известняков и доломитов (до 800 м)
- RF_3kt — Катавская свита. Известняки пестроокрашенные и сероцветные строматолитовые, пелитоморфные и их глинистые разности, редко доломиты (400–800 м)
- RF_3sh+lz — Шиханская и леузинская свиты объединенные. Известняки слоистые, массивные мелкокристаллические и пелитоморфные, иногда глинистые, строматолитовые; прослои аргиллитов, мергелей и доломитов (до 2000 м). Только на разрезе
- RF_3pr — Приютовская свита. Переслаивающиеся алевролиты, песчаники, аргиллиты и мергели; маломощные прослои доломитов (до 2000 м). Только на разрезе
- RF_3ln — Леонидовская свита. Песчаники кварцевые разнозернистые слоистые и массивные с вкраплениями каолинита, редкие маломощные прослои алевролитов и аргиллитов, линзы гравийных песчаников и конгломератов (110–800 м). Только на разрезе
- RF_3us — Усинская свита. Песчаники аркозовые и полевошпат-кварцевые розовые, светло- и зеленовато-серые, кирпично-красные мелко- и среднезернистые с прослоями алевролитов и аргиллитов (30–420 м). Только на разрезе

СРЕДНИЙ

- $\check{v}\beta RF_2p$ — Повальненский комплекс габбро-долеритовый гипабиссальный. Дайки габбродолеритов и габбро
- RF_2bm+br — Биктимировская и бретякская толщи объединенные. Чередование песчаников, алевролитов, аргиллитов; прослои мергелей, в верхней части — доломитов и известняков (до 1400 м)
  - RF_2av — Авзянская свита. Чередование доломитов обломочных и органогенных, песчаников, алевролитов, аргиллитов, сланцев углисто-глинистых, серицит-хлорит-кварцевых; вверху — прослои и линзы известняков с кремнистыми стяжениями, внизу — магнезитов и сидеритов (1000–2000 м)
- RF_2ol — Ольховская свита. Аргиллиты с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников полевошпат-кварцевых и доломитовых мергелей (до 1400 м). Только на разрезе
- $RF_2k\check{z}$ — Кужинская толща. Доломиты волнистослоистые, массивные органогенно-обломочные в неравномерном чередовании с мергелями, песчаниками мелкозернистыми мезомиктовыми, алевролитами кварцевыми доломитистыми и аргиллитами; редкие прослои магнезитов; в основании — песчаники мезомиктовые или аркозовые с линзами кварцевых гравелитов (до 450 м)
- RF_2zk — Зигазино-комаровская свита. Чередование (часто ритмичное) кварцевых, реже полевошпат-кварцевых песчаников, алевролитов и аргиллитов; их метаморфизованные аналоги: кварциты, сланцы мусковит(серицит)-графит-кварцевые, графит-хлоритоидно-кварцевые, графит-мусковит(серицит)-альбит-кварцевые, серицит(мусковит)-хлорит-кварцевые (950–1200 м)
- RF_2zg — Зигальгинская свита. Песчаники разнозернистые кварцевые, олигомиктовые и аркозовые с редкими прослоями (и пачками переслаивания) кварцевых алевролитов и аргиллитов (часто углеродистых) мелкогалечных конгломератов и гравелитов; местами линзы и прослои доломитов и известняков, в восточных разрезах при зеленосланцевом перерождении — слюдяные кварциты, сланцы гранат-кварц-слюдяные, кварц-слюдисто-хлоритовые (700–3000 м)
- γRF_2b_2 — Бердяушский комплекс монцодиорит-сиенит-гранитовый. Вторая фаза: граниты-рапакиви, сиениты, щелочные сиениты, нефелиновые сиениты.
- ξRF_2b_1 — Первая фаза: монцодиориты, кварцевые монцониты, реже габбро, монцогаббродиориты, монцогаббро
- $\xi\gamma RF_2b_2$ — Бердяушский комплекс монцодиорит-сиенит-гранитовый. Дайки сиенит-порфиров
- $\mu\beta RF_2b_1$ — Бердяушский комплекс монцодиорит-сиенит-гранитовый. Дайки габбро-порфиритов
- γRF_2ah — Ахмеровский комплекс гранитовый. Биотитовые граниты, лейкограниты
- $RF_2m\check{s}$ — Машакская свита. Метаморфизованные олигомиктовые песчаники и кварцевые алевролиты, сланцы серицит-кварц-хлоритовые, углеродсодержащие глинистые, железистые с линзами и прослоями гравелитов и конгломератов в основании, потоки лав миндалекаменных базальтов, риодацитов и трахириодацитов с прослоями их туфов и туфобрекчий; в кровле и основании — редкие линзы мраморизованных известняков (до 3000 м). Аюсапканская и белетарская свиты объединенные ($RF_2ds+b\check{t}$). Чередование массивных слюдистых кварцитов и невыдержанных пачек переслаивания кварц-мусковитовых сланцев и кварцитов, кварцитов и углеродисто-хлорит-кварцевых сланцев; прослои амфиболитов, реже мраморизованных известняков (до 750 м). Машакские субвулканические образования. Штоки метагаббродолеритов, метагаббро. Дайки метагаббро, метагаббродолеритов; метариолитов, метариодацитов
  - $\check{v}'RF_2m\check{s}$ — Машакская свита. Метаморфизованные олигомиктовые песчаники и кварцевые алевролиты, сланцы серицит-кварц-хлоритовые, углеродсодержащие глинистые, железистые с линзами и прослоями гравелитов и конгломератов в основании, потоки лав миндалекаменных базальтов, риодацитов и трахириодацитов с прослоями их туфов и туфобрекчий; в кровле и основании — редкие линзы мраморизованных известняков (до 3000 м). Аюсапканская и белетарская свиты объединенные ($RF_2ds+b\check{t}$). Чередование массивных слюдистых кварцитов и невыдержанных пачек переслаивания кварц-мусковитовых сланцев и кварцитов, кварцитов и углеродисто-хлорит-кварцевых сланцев; прослои амфиболитов, реже мраморизованных известняков (до 750 м). Машакские субвулканические образования. Штоки метагаббродолеритов, метагаббро. Дайки метагаббро, метагаббродолеритов; метариолитов, метариодацитов
  - $\check{\lambda}'RF_2m\check{s}$ — Машакская свита. Метаморфизованные олигомиктовые песчаники и кварцевые алевролиты, сланцы серицит-кварц-хлоритовые, углеродсодержащие глинистые, железистые с линзами и прослоями гравелитов и конгломератов в основании, потоки лав миндалекаменных базальтов, риодацитов и трахириодацитов с прослоями их туфов и туфобрекчий; в кровле и основании — редкие линзы мраморизованных известняков (до 3000 м). Аюсапканская и белетарская свиты объединенные ($RF_2ds+b\check{t}$). Чередование массивных слюдистых кварцитов и невыдержанных пачек переслаивания кварц-мусковитовых сланцев и кварцитов, кварцитов и углеродисто-хлорит-кварцевых сланцев; прослои амфиболитов, реже мраморизованных известняков (до 750 м). Машакские субвулканические образования. Штоки метагаббродолеритов, метагаббро. Дайки метагаббро, метагаббродолеритов; метариолитов, метариодацитов

РАННИЙ

- $\check{v}\beta RF_1k$ — Кургасский комплекс габбро-долеритовый гипабиссальный. Дайки и силлы габбродолеритов, габбро-порфиритов, габбро, долеритов
- RF_1nd — Надеждинская свита. Аркозовые и полевошпат-кварцевые песчаники с прослоями и линзами алевролитов, гравелитов, конгломератов и бурых аргиллитов; в верхней части — чередование аргиллитов, мергелей, доломитов, алевролитов, иногда мелкозернистых олигомиктовых песчаников (до 1000 м). Только на разрезе
- RF_1kl — Калтасинская свита. Доломиты с редкими прослоями и пачками чередования олигомиктовых и аркозовых алевролитов и черных аргиллитов с редкими линзами доломитовых мергелей и известняков (850–3000 м). Только на разрезе
- RF_1pk — Прикамская серия. Разнозернистые мезомиктовые или аркозовые песчаники и алевролиты с подчиненными прослоями аргиллитов, доломитов, мергелей и линзами гравелитов в основании (600–5000 м). Только на разрезе
- RF_1bk — Бакальская свита. Тонкоритмичное переслаивание сланцев углисто-глинистых и аргиллитов с кварцевыми алевропелитами, алевролитами, реже песчаниками косослоистыми слюдистыми; в нижней части — маломощные прослои доломитов и известняков (1000–1200 м)
- RF_1st — Саткинская свита. Доломиты, глинистые доломиты, известняки, сланцы глинисто-карбонатные, мергели; прослои углисто-глинистых сланцев, алевролитов, редко песчаников и магнезитов (2000–3500 м)
- RF_1al — Айская свита. Аркозовые, олигомиктовые и кварцевые песчаники, алевролиты, реже конгломераты; глинистые, углеродисто-глинистые сланцы; линзы доломитов; в основании — конглобрекчии, трахибазальты, трахиандезиты, их туфы (1700–2500 м)
- RF_1al+st — Айская и саткинская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты, глинистые и углеродисто-глинистые сланцы; доломиты, известняки, мергели, реже конгломераты (более 2000 м)
- $RF_1ji\check{s}$ — Юшинская свита. Сланцы глинистые, углисто-глинистые и серицит-кварцевые, алевролиты, песчаники кварцевые и олигомиктовые, внизу — линзы известняков, сидеритов (650–1050 м)
- RF_1sr — Суранская свита. Чередование известняков, доломитов, углисто-глинистых, глинистых сланцев и кварцевых или олигомиктовых алевролитов; прослои мергелей, в верхней части — линзы магнезитов (1000–2800 м)
- RF_1bi — Большеинзерская свита. Ритмичное чередование средне- и мелкозернистых кварцевых и олигомиктовых песчаников, алевропесчаников и алевролитов с прослоями известняков, доломитов и углисто-глинистых, кварц-хлорит-серицитовых углеродсодержащих сланцев; в нижней части — единичные прослои и линзы гравелитов, мелкогалечных конгломератов и конглобрекчий (более 2200 м)
- RF_1kz — Кызылташская свита. Сланцы и кристаллосланцы карбонат-кварц-хлоритовые и гранат-плагиоклаз-амфиболовые, реже мусковит-графит-плагиоклаз-карбонатные, двуслюдяно-плагиоклаз-кварцевые, кварц-биотит-амфиболовые и плагиоклаз-хлоритовые; амфиболиты с редкими прослоями кварцита, кварц-углеродистых и слюдисто-углеродисто-кварцевых сланцев, в нижней части — мраморы и мраморизованные известняки, доломиты и магнезиты (до 2000 м)
- RF_1bg — Буганакская свита. Невыдержанное переслаивание массивных и рассланцованных кальцитовых мраморов, мусковит-биотит-хлорит-альбитовых сланцев и слоистых разнозернистых слюдистых кварцитов; маломощные прослои и линзы апобазитовых эклогитов и амфиболитов (более 400 м)

АРХЕЙ

РАННИЙ

ПОЗДНИЙ

- $AR_2-PR_1\check{b}\check{c}+un$ — Большечеремшанская серия и унийская толща объединенные. Гнейсы андалузит-биотитовые, биотит-амфиболовые и диафториты по ним; паракристаллосланцы переменного состава (более 800 м). Только на разрезе
- $\gamma_1AR_2?t$ — Тараташский комплекс гнейсодиорит-гнейсогранитовый. Гнейсогранитты, реже гнейсогранодиориты. Гиперстеновые габбродиоритогнейсы, гнейсодиориты
- $g\check{v}\check{o}AR_2?t$ — Тараташский комплекс гнейсодиорит-гнейсогранитовый. Гнейсогранитты, реже гнейсогранодиориты. Гиперстеновые габбродиоритогнейсы, гнейсодиориты
- AR_2tr — Тараташский комплекс. Кристаллосланцы амфибол-пироксен-плагиоклазовые, магнетит-гиперстеновые; гнейсы и плагиогнейсы различного состава, иногда графитсодержащие, амфиболиты, магнетитовые и биотитовые кварциты, основные и кислые гранулиты, гиперстенсодержащие мигматиты (4000–4800 м)

Картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, Санкт-Петербург, Средний пр., 72. Тел. 321-8121, факс 321-8153

Оформлено и отпечатано на Картографической фабрике ВСЕГЕИ
Заказ 81011030. Тираж 150 экз. Подписано к печати 30.09.2013